

J.nr. 2025-167079
Ref. LOUIF, LTM, EMSHE, STM
Dato: 08-10-2025

Højpatogen fugleinfluenza i Europa i relation til truslen for Danmark pr. 8. oktober 2025

Trusselsvurdering:

Fødevarestyrelsen har udarbejdet en trusselsvurdering for højpatogen fugleinfluenza (HPAI), som afløser vurderingen fra 11. august 2025.

Fødevarestyrelsen vurderer, at den samlede sandsynlighed for introduktion af HPAI til danske fjerkræbesætninger gennem kontakt til vilde fugle er steget fra **LAV** til **MIDDEL**.

Fødevarestyrelsen vurderer endvidere, at den samlede risiko for smitte med HPAI til dansk fjerkræ gennem samhandel er uændret, dvs. fortsat **LAV**

Smitteveje	Sandsynlighed for introduktion pr. 08/10-2025
Vilde fugle	Middel
Samhandel med fjerkræ/rugeæg	Lav

Risikobegrænsning:

Fødevarestyrelsen gør opmærksom på, at:

1. Trusselsniveauet er steget, da fugletrækket fra nordøst mod sydvest er sat ind. Det betyder, at millioner af vilde ande- og gåsefugle vil passere Danmark i de næste måneder på vej sydover.
2. I Danmark er der påvist udbrud af HPAI i en fjerkræbesætning med æglægere. Antal udbrud i fjerkræ og fugle i fangenskab i EU stiger.
3. Der er påvist HPAI i en vild fugl i Danmark. Dette viser, at virus igen cirkulerer i de vilde fugle i Danmark. Der er også påvist højpatogen fugleinfluenza i vilde fugle i flere EU-lande.
4. Trusselsniveauet er dermed steget, og alle fugleejere og fjerkrævirksohmheder skal være særligt opmærksomme på risikoen for introduktion af fugleinfluenza ved at praktisere god smittebeskyttelse. Det er ejerens ansvar at sikre god smittebeskyttelse og forhindre smittespredning af HPAI til sine fugle.
5. Fødevarestyrelsen ønsker stadig indrapportering af fund af døde, vilde fugle og opfordrer til at relevante fund indmeldes via App'en "FugleinfluenzaTip".

Fødevarestyrelsen følger situationen i Europa tæt og opdaterer trusselsvurderingen, når det vurderes relevant.

Highly pathogenic avian influenza in Europe in relation to the threat to Denmark per 08 October, 2025

Rapid risk assessment:

The Danish Veterinary and Food Administration has assessed the risk of highly pathogenic avian influenza (HPAI), which replaces the assessment from 11 August, 2025.

The Danish Veterinary and Food Administration estimates that the overall probability of introduction for HPAI to Danish poultry herds due to contact with wild birds has reduced from **Low to Medium**

The Danish Veterinary and Food Administration also assesses that the overall risk of infection with HPAI to Danish poultry through trade is unchanged and remains Low.

Risk pathway	Probability of introduction level 08/10-2025
Wild birds	Medium
Trade of poultry and hatching eggs	Low

Risk mitigation:

The Danish Veterinary and Food Administration advises:

1. The threat level has increased as migration of birds from Northeast to Southwest has begun. This means that millions of wild birds (primarily geese) will be passing through Denmark during the next months on their way south.
2. One outbreak of HPAI has been detected in Denmark in a poultry establishment with layers. The number of outbreaks in poultry and captive birds in other EU countries is also increasing.
3. HPAI has been detected in a wild bird in Denmark. The detection proves that HPAI-virus is present in the wild bird population in Denmark. HPAI has also been detected in wild birds in other EU countries.
4. The threat of HPAI-introduction has increased and all owners of poultry and captive birds must ensure a very high level of biosecurity in order to mitigate the risk. Biosecurity is the responsibility of the owner.
5. The Danish Veterinary and Food Administration encourages the public to report finding of dead wild birds using the App "FugleinfluenzaTip".

The Danish Veterinary and Food Administration closely monitors the situation in Europe and updates the assessment, when it is considered relevant.

Baggrund

Aviær influenza, også kaldet fugleinfluenza, skyldes smitte med særlige typer af influenza A-virus. Aviær influenza er en zoonose. Andre pattedyr smittes af og til sporadisk med fugleinfluenza, og i sjældne tilfælde kan sygdommen smitte til mennesker. Videreførelse af smitte kan ske ved meget tæt kontakt med inficerede fugle.

Sygdommen inddeles i to grupper på baggrund af virus evne til at forårsage sygdom hos modtagelige fugle:

- Højpatogen aviær influenza (HPAI), som forårsager en særdeles alvorlig sygdom, der er kendetegnet ved en generaliseret infektion af det inficerede fjerkræ og kan medføre en meget høj flokdødelighed. Indtil videre er det kun virus af undertyperne H5 og H7, der er påvist som årsag til HPAI.
- Lavpatogen aviær influenza (LPAI), som forårsager en mild sygdom hos fjerkræ ved primært at inficere luftvejene, medmindre der indtræder en forværing som følge af andre samtidige infektioner eller faktorer. LPAI af undertyperne H5 og H7 har endvidere evnen til at kunne ændre sig til den højpatogene type (HPAI).

Smittede fugle udskiller virus via sekreter fra luftvejene og gennem afføring. Smitten overføres nemt via inficeret foder og drikkevand. Smitten kan overføres med beklædning, fodersække, ikke-desinficerede rugeæg, redskaber, maskiner m.v. Vilde fugle, især trækkende vandfugle, udgør et reservoir for influenza A-virus.


Den mest effektive måde at forebygge introduktion af HPAI i fjerkræproduktionen er ved konsekvent at anvende passende smittebeskyttelsesforanstaltninger. Fødevarestyrelsen (FVST) giver eksempler på sådanne foranstaltninger under afsnittet **“Husk god smittebeskyttelse”** i dette dokument.

Du har pligt til at kontakte en dyrlæge, hvis dit fjerkræ eller dine fugle i fangenskab udviser symptomer på fugleinfluenza. Du kan læse mere under afsnittet **“Husk din anmeldepligt ved mistanke om fugleinfluenza”** i dette dokument.

Nuværende situation – pr. 08. oktober 2025

Vilde fugle

Fødevarestyrelsen sænkede yderligere trusselsniveauet fra middel til lav den 11. august 2025. Siden da er 31 fugle testet negativ, mens der er påvist HPAI H5N1 i en hættemåge fundet d. 29. september



Figur 1. Positiv-procenten af vilde fugle indleveret til SSI til analyse siden 11. august. Kilde: Fugleinfluenza beredskab (fvst.dk) 10.10.25

I Europa er der siden den 01. september 2025 indrapporteret 38 udbrud af HPAI i vilde fugle, hvoraf Spanien (n=12) og Portugal (n=5) har foretaget flest indrapporteringer (Tabel 1 og Figur 2). I denne periode har størstedelen af HPAI-indberetningerne i vilde fugle været i måger, idet disse udgjorde 37% ud af de 38 vilde fugle, der blev rapporteret positive for HPAI.

Tabel 1. Fugleinfluenza udbrud hos vilde fugle i Europa i perioden fra 1. september og 8. oktober 2025. Kilde ADIS 08.10.25.


Country/Territory	HPAI(NON-P) in Wild Birds
Austria	5
Denmark	1
France	4
Germany	1
Hungary	1
Iceland	2
Latvia	1
Norway	4
Poland	1
Portugal	5
Spain	12
Sweden	1
Grand Total	38

Udbrud af HPAI i fjerkræ og andre fugle i fangenskab


Siden den 1. september 2025 er der rapporteret 25 udbrud af HPAI hos fjerkræ i EU, hvoraf hovedparten er registreret i Spanien med 8 udbrud, Polen med 6 udbrud og Tyskland med 6 udbrud. Derudover er der registreret to udbrud hos fugle i fangenskab (jf. tabel 2 og figur 2).

Tabel 2 Fugleinfluenza udbrud i fjerkræ og fugle i fangenskab i Europa i perioden fra 1. september til 8. oktober 2025. Kilde ADIS 08.10.25.

Country/Territory	Highly pathogenic avian influenza	HPAI(NON-P) in Captive Birds	Total
Czech Republic		1	1
Denmark	1		1
Germany	6		6
Italy	1		1
Netherlands	1		1
Norway	1		1
Poland	6		6
Portugal	1	1	2
Spain	8		8
Grand Total	25	2	27



Figur 2. Kort over indrapporteringer over vilde fugle med HPAI i Europa i perioden fra 01. september til 08. oktober 2025. Kilde ADIS 08.10.25



Figur 3. Oversigt over antal udbrud per uge i Europa i sæsonen 2024-25. Kilde ADIS 11.08.25.

Samlet vurdering

Truslen fra de vilde fugle

Danmark ligger centralt placeret på mange fuglebestandes træk-ruter, og derfor øges risikoen for smitte i forbindelse med, at fuglene trækker fra syd til nord om foråret og fra nord til syd om efteråret. I 2022 og 2023 var der udbrud af HPAI i kolonirugende fuglearter så som splitterner, måger og havterner, der ruger i Danmark om sommeren. Dette har ikke været tilfældet hverken i 2024 eller 2025.

Følgende betragtninger indgår i vurderingen:

1. De store fugletræk af flere fuglearter fra nordlige Europa er nu i gang.
2. Antal af udbrud i fjerkræ, fugle i fangenskab og vilde fugle stiger i Europa.
3. Det første positive fund af HPAI i en vild fugl i Danmark i efterårssæsonen er påvist i overvågningen i en hættemåge fundet d. 29. september.
4. Der er d. 7. oktober påvist udbrud af HPAI H5N1 i en fjerkræbesætning med æglæggere.

Baseret på ovenstående vurderer Fødevarestyrelsen, at den samlede sandsynlighed for introduktion af HPAI til danske fjerkrævirksomheder og fuglehold gennem kontakt til vilde fugle skal hæves fra **LAV** til **MIDDEL**.

Samhandel og transport af fjerkræ

Som følge af situationen i Europa er der risiko for indslæbning af fugleinfluenza via ikke tilstrækkeligt rengjorte lastbiler, der transporterer slagtekyllinger, rugeæg og fjerkræ på tværs af de europæiske grænser.

Fødevarestyrelsen har gennemført stikprøvebaseret kontrol af fjerkrætransportbiler og vil fortsat have opmærksomhed på dette i kontrollen. Fødevarestyrelsen vurderer, at sandsynligheden for et udbrud af fugleinfluenza i en fjerkrævirksomhed i Danmark, som følge af utilstrækkeligt rengjorte transportbiler, fortsat er LAV.

Risikobegrænsning:

Transportmidler, der har været anvendt til erhvervsmæssig transport af fjerkræ, skal efter transporten rengøres og desinficeres.

Tabel 4. Smitteveje og sandsynlighed for introduktion

Smitteveje	Sandsynlighed for introduktion pr. 08/10-2025
Samhandel og transport af fjerkræ/rugeæg	Lav
Vilde fugle	Middel

Husk god smittebeskyttelse

Du skal som fjerkræejер sikre god smittebeskyttelse for at forebygge smitte med fugleinfluenza. Dette gælder også for fugle i fangenskab.

Eksempler på god smittebeskyttelse:

- Fjerkræ eller fugle i fangenskab fodres og vandes indendørs eller under fast tag eller fast overdækning, der sikrer, at større vilde fugle ikke kommer i kontakt med det foder og vand, som er beregnet til dit fjerkræ eller dine andre fugle.
- Undgå at opdræt eller hold af ænder eller gæs har fysisk kontakt med andet fjerkræ eller fugle i fangenskab.
- Undgå at fjerkræ eller fugle i fangenskab får vand fra overfladevandreservoirer (f.eks. fra søer eller åer) – herunder opsamlet regnvand.
- Sørg for afskærmning af udendørsbassiner, herunder anlagte og naturlige søer og vandhuller, som dit fjerkræ eller dine fugle i fangenskab har adgang til, så større vilde fugle ikke kan få adgang til bassinet.

[Yderligere information kan findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside.](#)

Fødevarestyrelsens information er i overensstemmelse med European Food Safety Authority's (EFSA) anbefalinger.

Husk din anmeldepligt ved mistanke om fugleinfluenza

Du har pligt til at kontakte en dyrlæge, hvis der hos dit fjerkræ eller fugle i fangenskab opstår symptomer på fugleinfluenza. Det kan f.eks. være øget dødelighed, ophørt æglægning, luftvejssymptomer, øjenbetændelse med tåreflåd, betændelse i hovedets hulrum, diarré og eventuelt væskeansamlinger samt blåfarvning af huden, især i hovedet.

Tidlige tegn på smitte kan være appetitløshed, nedsat drikkelyst og forholdsvis lille dødelighed. Men sygdommen kan også pludselig optræde i en flok, hvor mange fugle dør, enten uden forvarsel eller med minimale tegn på nedstemthed, appetitløshed, pjusket fjerdragt og feber.

På Fødevarestyrelsens [hjemmeside](#) finder du informationer om, hvordan du som fjerkræjer og ejer af fugle i fangenskab skal forholde dig ved mistanke om sygdom i dit fjerkræ.

Generelle forholdsregler

Uanset om du har fugle i fangenskab eller er professionel fjerkræavler, skal du altid overholde basale smittebeskyttende foranstaltninger som f.eks. skift og desinfektion af fodtøj, inden du går ind i din hønsegård. Det styrker også smittebeskyttelsen at afskærme eller overdække hønsegården, så vilde fugle ikke kan lande blandt fjerkræet. Til overdækning kan bruges f.eks. en presenning, net eller tråd.

Har du *fjerkræ* eller har du *fugle i fangenskab*?

Dyresundhedsloven definerer **fjerkræ**, som fugle, der opdrættes eller holdes med henblik på kødproduktion, konsumægsproduktion eller produktion af andre produkter uanset race, samt avl af fugle til disse formål. Fjerkræ er også fugle, der holdes med henblik på fornyelse af vildtbestande.

Fugle i fangenskab er alle andre fugle, forudsat at deres produkter kun bruges i egen husholdning. Det er også fugle, der kun holdes med henblik på opvisninger, kapflyvninger, udstillinger, konkurrencer og lignende, inklusivt med henblik på avl eller salg til disse formål.

Du kan læse den præcise ordlyd i: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 [EUR-Lex - 32016R0429 - EN - EUR-Lex \(europa.eu\)](#). Læs mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside [her](#).

Er du jæger?

Er du jæger, bør du endvidere være påpasselige med hygiejnen efter jagt, så du ikke slæber smitte med hjem i hønsegården. Konkret er det f.eks. en god ide med støvlevask og at holde nedlagt vildt adskilt fra fjerkræ.

Har du været i udlandet?

Hvis du har været i kontakt med fjervildt eller fjerkræ i udlandet, anbefaler Fødevarestyrelsen, at du venter 48 timer inden et besøg i en dansk fjerkræbesætning, da du kan medbringe fjerkræsygdomme fra udlandet.

Har du modtaget fjerkræ fra udlandet eller påtænker at gøre det?

Hvis du indfører fjerkræ fra lande med HPAI, bør du være ekstra opmærksom på sygdomstegn hos dyrene, og huske din anmeldepligt ved symptomer på fugleinfluenza (se afsnit om anmeldepligt ovenfor).

Er du transportør af fjerkræ eller rugeæg?

Operatører, herunder transportører, skal sikre, at transportmidler, der anvendes til transport af fjerkræ eller rugeæg, rengøres og desinficeres hurtigst muligt efter hver transport, jf. artikel 4 i Kommissionens delegerede forordning 2020/688.

Når du som transportør af fjerkræ færdes i udlandet, skal du være opmærksom på, at du ikke må køre ind i restriktionszoner i inficerede områder uden tilladelse fra landets veterinærmyndigheder. Hvis du har fået tilladelse til at køre ind i en zone, skal myndighedernes anvisninger om smittebeskyttelse følges. Sørg for at etablere ekstra smittebeskyttelse ved ind- og udkørsel af zonen.

Indmeld fund af døde vilde fugle

Indmeldinger af døde vilde fugle er værdifulde for Fødevarestyrelsen, da undersøgelserne af fuglene giver Fødevarestyrelsen et godt overblik over udbredelsen af fugleinfluenza blandt de vildtlevende fugle i Danmark.

Hvis du finder døde eller syge vilde fugle i naturen, er Fødevarestyrelsen derfor meget interesseret i at få besked om dit fund særligt, hvis det drejer sig om:

- Vandfugle
- Rovfugle
- Kragefugle
- Måger

Husk, at du kan bruge app'en "FugleinfluenzaTip" til at melde fund af døde vilde fugle ind til Fødevarestyrelsen.

Liste over de fuglearter, der har mest interesse for Fødevarestyrelsen, kan findes på siden her under [Tip Fødevarestyrelsen, hvis du finder en død fugl i naturen](#).

Læs mere om, hvordan du ellers kan indmelde fundene på Fødevarestyrelsens hjemmeside [her](#).

Følg med i AI overvågningen i vildfugle i Danmark her: <https://ai.fvst.dk/>

Referencer

ADIS meddelelser fra EU Kommissionen.

Info notes fra EU Kommissionen.

European Commission. (n.d.). Animal Disease Information System (ADIS). Retrieved from [https://food.ec.europa.eu/animals/animal-diseases/animal-disease-information-system-adis_en#:~:text=The%20EU%20Animal%20Diseases%20Information,Animal%20Health%20Law%20\(AHL\)%20](https://food.ec.europa.eu/animals/animal-diseases/animal-disease-information-system-adis_en#:~:text=The%20EU%20Animal%20Diseases%20Information,Animal%20Health%20Law%20(AHL)%20).

Fugleinfluenza databasen: [Fugleinfluenza beredskab \(fvst.dk\)](https://fvst.dk/)

[Kommissionens delegerede forordning \(EU\) 2020/687 af 17. december 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning \(EU\) 2016/429 for så vidt angår regler om forebyggelse og bekæmpelse af visse listeopførte sygdomme \(EØS-relevant tekst\)](#)

[Kommissionens delegerede forordning \(EU\) 2020/688 af 17. december 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning \(EU\) 2016/429 for så vidt angår dyresundhedsmæssige krav vedr. flytning inden for Unionen af landdyr og rugeæg.](#)

EFSA's kampagne om forebyggelse af fugleinfluenza: [Stop fugleinfluenza: beskyt din bedrift! | EFSA](#)