

J.nr. 2025-175741
Ref. FRAFE, LTM, EMSHE, STM
Dato: 23-10-2025

Højpatogen fugleinfluenza i Europa i relation til truslen for Danmark pr. 23. oktober 2025

Trusselsvurdering:

Fødevarestyrelsen har udarbejdet en trusselsvurdering for højpatogen fugleinfluenza (HPAI), som afløser vurderingen fra 8. oktober 2025.

Fødevarestyrelsen vurderer, at den samlede sandsynlighed for introduktion af HPAI til danske fjerkræbesætninger gennem kontakt til vilde fugle øges fra **MIDDEL til HØJ**.

Fødevarestyrelsen vurderer endvidere, at den samlede risiko for smitte med HPAI til dansk fjerkræ gennem samhandel er uændret dvs. fortsat **lav**.

Smitteveje	Sandsynlighed for introduktion pr. 23/10-2025
Vilde fugle	Høj
Samhandel med fjerkræ/rugeæg	Lav

Risikobegrænsning:

Fødevarestyrelsen gør opmærksom på at:

1. Trusselsniveauet er steget, da antal udbrud i fjerkræ og fugle i fangenskab i det vestlige EU stiger.
2. Der er blevet påvist udbredt smitte af fugleinfluenza hos forskellige vilde fuglearter flere steder i Danmark. Det tyder på, at virusset igen cirkulerer blandt vilde fugle.
3. På baggrund af at trusselsniveauet stiger til høj indføres indeluknings- og overdækningskrav fra den 27. oktober 2025.
4. Alle fugleejere og fjerkrævirksomheder skal være særligt opmærksomme på risiko for introduktion af HPAI udefra ved at fastholde høj smittebeskyttelse. Smittebeskyttelse er ejerens ansvar.
5. Fødevarestyrelsen ønsker stadig indrapportering af fund af døde vilde fugle.

Fødevarestyrelsen følger situationen i Europa tæt og opdaterer trusselsvurderingen, når det vurderes relevant.

Highly pathogenic avian influenza in Europe in relation to the threat to Denmark per 23 October, 2025

Rapid risk assessment:

The Danish Veterinary and Food Administration has assessed the risk of highly pathogenic avian influenza (HPAI), which replaces the assessment from 8 October, 2025.

The Danish Veterinary and Food Administration estimates that the overall probability of introduction for HPAI to Danish poultry herds due to contact with wild birds increases from **MEDIUM to HIGH**.

The Danish Veterinary and Food Administration also assesses that the overall risk of infection with HPAI to Danish poultry through trade is unchanged and remains **low**.

Risk pathway	Probability of introduction level 23/10-2025
Wild birds	High
Trade of poultry and hatching eggs	Low

Risk mitigation:

As a consequence of the increased probability of introduction, the Danish Veterinary and Food Administration wants to draw your attention to:

1. The probability of introduction level has increased, as the number of outbreaks in western Europe is rising.
2. HPAI has been detected in different species of wild birds in several places in Denmark, suggesting widespread infection in wild birds.
3. Based on the increasing probability of introduction to 'high', requirements for confinement and covering of poultry will be introduced from 27 October 2025.
4. Poultry and bird holders are recommended to maintain very high levels of biosecurity on top of the obligations above. Biosecurity is the responsibility of the operator.
5. The Danish Veterinary and Food Administration encourages the public to report findings of dead wild birds.

The Danish Veterinary and Food Administration closely monitors the situation in Europe and updates the assessment, when it is considered relevant.

Baggrund

Aviær influenza, også kaldet fugleinfluenza, skyldes smitte med særlige typer af influenza A-virus. Aviær influenza er en zoonose. Andre pattedyr smittes af og til sporadisk med fugleinfluenza, og i sjældne tilfælde kan sygdommen smitte til mennesker. Videreførelse af smitte kan ske ved meget tæt kontakt med inficerede fugle.

Sygdommen inddeles i to grupper på baggrund af virus evne til at forårsage sygdom hos modtagelige fugle:

- Højpatogen aviær influenza (HPAI), som forårsager en særdeles alvorlig sygdom, der er kendetegnet ved en generaliseret infektion af det inficerede fjerkræ og kan medføre en meget høj flokdødelighed. Indtil videre er det kun virus af undertyperne H5 og H7, der er påvist som årsag til HPAI.
- Lavpatogen aviær influenza (LPAI), som forårsager en mild sygdom hos fjerkræ ved primært at inficere luftvejene, medmindre der indtræder en forværring som følge af andre samtidige infektioner eller faktorer. LPAI af undertyperne H5 og H7 har endvidere evnen til at kunne ændre sig til den højpatogene type (HPAI).

Smittede fugle udskiller virus via sekreter fra luftvejene og gennem afføring. Smitten overføres nemt via inficeret foder og drikkevand. Smitten kan overføres med beklædning, fodersække, ikke-desinficerede rugeæg, redskaber, maskiner m.v. Vilde fugle, især trækkende vandfugle, udgør et reservoir for influenza A-virus.

Den mest effektive måde at forebygge introduktion af HPAI i fjerkræproduktionen er ved konsekvent at anvende passende smittebeskyttelsesforanstaltninger. Fødevarestyrelsen (FVST) giver eksempler på sådanne foranstaltninger under afsnittet **“Husk god smittebeskyttelse”** i dette dokument.


Derudover har du pligt til at kontakte en dyrlæge, hvis dit fjerkræ eller dine fugle i fangenskab udviser symptomer på fugleinfluenza. Du kan læse mere under afsnittet **“Husk din anmeldepligt ved mistanke om fugleinfluenza”** i dette dokument.

Nuværende situation – pr. 23. oktober 2025

Vilde fugle

Fra 22. september til den 23. oktober har Fødevarestyrelsen i modtaget 23 døde vilde fugle til analyse, hvoraf 15 har testet positiv for fugleinfluenza. Ud af disse blev 14 fundet gennem den passive overvågning, dvs. overvågning af døde vilde fugle. Én fugl blev fundet via den aktive overvågning, hvilket vil sige en tilsyneladende rask vild fugl, som er nedlagt under jagt.

I løbet af de seneste fire uger har Fødevarestyrelsen observeret en markant stigning i antallet af fund af døde vilde fugle, som efterfølgende er testet positive for fugleinfluenza (Figur 1).




Figur 1 Positiv-procenten af vilde fugle indleveret til Statens Serum Institut til analyse.
Kilde: Fugleinfluenza beredskab (fvst.dk) 23.10.25

HPAI spreder sig aktuelt blandt vilde fugle i Danmark og er i stigning. Danmark har indberettet 8 fund af HPAI i vilde fugle fra forskellige steder. Fundene omfatter i alt 15 fugle.

Siden den 29. september 2025 (uge 40) er der i Europa indrapporteret 73 fund af HPAI i vilde fugle. Tyskland (27) og Danmark (8) står for størstedelen af disse rapporter (se Tabel 1 og Figur 2). I denne periode er der indberetninger fra hele Europa (Figur 2).

Tabel 1. Fugleinfluenza udbrud hos vilde fugle i Europa mellem 29. september og 23. oktober 2025. Kilde ADIS 23.10.25

Country/Territory	HPAI(NON-P) in Wild Birds
Austria	5
Belgium	4
Denmark	8
France	6
Germany	27
Hungary	1
Italy	4
Latvia	2
Lithuania	3
Norway	4
Poland	1
Portugal	2
Spain	6
Grand Total	73



Figur 2. Kort over indrapporteringer over vilde fugle med HPAI i Europa mellem 29. september og 23. oktober 2025. Kilde ADIS 23.10.25

De største fugletræk er fra fuglenes nordlige standpladser og går gennem Danmark, når fuglene flyver sydpå. På denne tid af året flytter fuglene sig regionalt som følge af ændringer i vinter-temperaturen, og de kan gøre ophold undervejs.

Udbrud af HPAI i fjerkræ og andre fugle i fangenskab

I indeværende sæson (startende 29. september 2025) har der været 53 udbrud i fjerkræ og 13 udbrud i fugle i fangenskab i Europa, som er indrapporteret til ADIS. Hovedparten af udbruddene har været koncentreret i Tyskland (18), Spanien (8) og Polen (7). Af de 13 udbrud i fugle i fangenskab, har Frankrig (4) rapporteret flest (tabel 2 og figur 3).


Tabel 2. Fugleinfluenza udbrud i fjerkræ og fugle i fangenskab i Europa mellem 29. september og 23. oktober 2025. Kilde ADIS 23.10.25

Country/Territory	Highly pathogenic avian influenza (poultry)	HPAI(NON-P) in Captive Birds	Total
Belgium	1	1	2
Bulgaria	3		3
Denmark	3		3
France	4	4	8
Germany	18		17
Ireland		1	1
Italy	6		6
Lithuania	1		1
Netherlands	1		1
North Macedonia		1	1
Poland	7		7
Slovakia	1	2	3
Spain	8	3	11
Sweden		1	1
Grand Total	53	13	66

HPAI outbreaks in poultry and other captive birds in Europe between 29 Sep. - 23 Oct. 2025

Disease name
● High pathogenicity avian influenza (Poultry)
● HPAI(NON-P) in Captive Birds

0 500 1.000 km



Figur 3 HPAI i fjerkræ og fugle i fangenskab i Europa mellem 29. september og 23. oktober 2025. Kilde: ADIS, 23.10.2025.

Samlet vurdering

Truslen fra de vilde fugle

Følgende forhold indgår i vurderingen:

1. Antallet af udbrud med HPAI hos fjerkræ – især i Tyskland – stiger støt, og smittede vilde fugle rapporteres i det nordlige Tyskland, Belgien og andre nordeuropæiske lande.
2. HPAI er blevet påvist hos vilde fugle flere steder i Danmark, hvilket viser, at virusset nu aktivt spreder sig blandt vilde fugle.

På baggrund af ovenstående vurderer Fødevarestyrelsen, at den samlede sandsynlighed for introduktion af HPAI til danske fjerkræbesætninger via kontakt med vilde fugle bør hæves fra **MIDDEL** til **HØJ**.

Samhandel og transport af fjerkræ

Som følge af situationen i Europa og transport af slagtekyllinger, rugeæg og fjerkræ på tværs af de europæiske grænser er der risiko for introduktion af fugleinfluenza gennem ikke tilstrækkeligt rengjorte lastbiler, der transporterer dyrene imellem Danmark og de europæiske lande.

Fødevarestyrelsen har gennemført stikprøvebaseret kontrol af fjerkræ transportbiler og vil fortsat have opmærksomhed på dette i kontrollen. Fødevarestyrelsen vurderer,

at sandsynligheden for et udbrud af fugleinfluenza i en fjerkræbesætning i Danmark som følge af utilstrækkeligt rengjorte transportbiler fortsat er LAV.

Risikobegrænsning:

Transportmidler, der har været anvendt til erhvervsmæssig transport af fjerkræ, skal efter transporten rengøres og desinficeres.

Tabel 4. Smitteveje og sandsynlighed for introduktion

Smitteveje	Sandsynlighed for introduktion pr. 23/10-2025
Samhandel og transport af fjerkræ/rugeæg	Lav
Vilde fugle	Høj

Husk god smittebeskyttelse

Smittede trækfugle kommer stadig til Danmark! Du skal som fjerkræejer sikre god smittebeskyttelse for at forebygge smitte med fugleinfluenza. Dette gælder også for fugle i fangenskab.

Eksempler på god smittebeskyttelse:

- Fjerkræ eller fugle i fangenskab fodres og vandes indendørs eller under fast tag eller fast overdækning, dermed sikres, at større vilde fugle ikke kommer i kontakt med det foder og vand, der er beregnet til dit fjerkræ eller dine andre fugle.
- Undgå, at opdræt eller hold af ænder eller gæs har fysisk kontakt med andet fjerkræ eller fugle i fangenskab.
- Undgå, at fjerkræ eller fugle i fangenskab får vand fra overfladevandreservoirer (f.eks. fra søer eller åer) – herunder opsamlet regnvand.
- Udendørsbassiner, herunder anlagte og naturlige søer og vandhuller, som dit fjerkræ eller dine fugle i fangenskab har adgang til, afskærmes, så større vilde fugle ikke kan få adgang til bassinet.

[Yderligere information kan findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside.](#)

Husk din anmeldepligt ved mistanke om fugleinfluenza

Du har pligt til at kontakte en dyrlæge, hvis der hos dit fjerkræ eller fugle i fangenskab opstår symptomer på fugleinfluenza. Det kan f.eks. være øget dødelighed, ophørt æglægning, luftvejssymptomer, øjenbetændelse med tåreflåd, betændelse i hovedets hulrum, diarré og eventuelt væskeansamlinger samt blåfarvning af huden, især i hovedet.

Tidlige tegn på smitte kan være appetitløshed, nedsat drukkelyst og forholdsvis lille dødelighed. Men sygdommen kan også pludselig optræde i en flok, hvor mange fugle dør, enten uden forvarsel eller med minimale tegn på nedstemthed, appetitløshed, pjusket fjerdragt og feber.

På Fødevarestyrelsens [hjemmeside](#) finder du informationer om, hvordan du som fjerkræjer og ejer af fugle i fangenskab skal forholde dig ved mistanke om sygdom i dit fjerkræ.

Generelle forholdsregler

Uanset om du har fugle i fangenskab eller er professionel fjerkræavler skal du altid overholde basale smittebeskyttende foranstaltninger som skift og desinfektion af fodtøj, inden du går ind i din hønsegård. Det styrker også smittebeskyttelsen at afskærme eller overdække hønsegården, så vilde fugle ikke kan lande blandt fjerkræet. Til overdækning kan bruges f.eks. en presenning, net eller tråd.

Har du *fjerkræ* eller har du *fugle i fangenskab*?

Dyresundhedsloven definerer **fjerkræ**, som fugle der opdrættes eller holdes med henblik på kødproduktion, konsumægs-produktion eller produktion af andre produkter uanset race, samt avl af fugle til de formål. Fjerkræ er også fugle, der holdes med henblik på fornyelse af vildt bestande.

Fugle i fangenskab er alle andre fugle, forudsat at deres produkter kun bruges i egen husholdning. Det er også fugle, der kun holdes med henblik på opvisninger, kapflyvninger, udstillinger, konkurrencer, og lignende, inklusivt med henblik på avl eller salg til disse formål.

Du kan læse den præcise ordlyd i: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 [EUR-Lex - 32016R0429 - EN - EUR-Lex \(europa.eu\)](#). Læs mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside [her](#)

Er du jæger?

Er du jæger, bør du endvidere være påpasselige med hygiejnen efter jagt, så du ikke slæber smitte med hjem i hønsegården. Konkret er det f.eks. en god ide med støvlevask, og at holde nedlagt vildt adskilt fra fjerkræ.

Har du været i udlandet?

Hvis du har været i kontakt med fjervildt eller fjerkræ i udlandet, anbefaler Fødevarestyrelsen, at du venter 48 timer inden et besøg i en dansk fjerkræbesætning, da du kan medbringe fjerkræsygdomme fra udlandet.

Har du modtaget fjerkræ fra udlandet eller påtænker at gøre det?

Hvis du indfører fjerkræ fra lande med HPAI, bør du være ekstra opmærksom på sygdomstegn hos dyrene, og huske din anmeldepligt ved symptomer på fugleinfluenza (se afsnit om anmeldepligt ovenfor).

Er du transportør af fjerkræ eller rugeæg?

Operatører, herunder transportører, skal sikre, at transportmidler, der anvendes til transport af fjerkræ eller rugeæg, rengøres og desinficeres hurtigst muligt efter hver transport, jf. artikel 4 i Kommissionens delegerede forordning 2020/688.

Når du som transportør af fjerkræ færdes i udlandet, skal du være opmærksom på, at du ikke må køre ind i restriktionszoner i inficerede områder uden tilladelse fra landets veterinærmyndigheder. Hvis du har fået tilladelse til at køre ind i en zone, skal myndighedernes anvisninger om smittebeskyttelse følges. Sørg for at etablere ekstra smittebeskyttelse ved ind- og udkørsel af zonen.

Indmeld fund af døde vilde fugle

Indmeldinger af døde vilde fugle er værdifulde for Fødevarestyrelsen, da undersøgelserne af fuglene giver Fødevarestyrelsen et godt overblik over udbredelsen af fugleinfluenza blandt de vildtlevende fugle i Danmark.

Hvis du finder døde eller syge vilde fugle i naturen, er Fødevarestyrelsen meget interesseret i at få besked om dit fund særligt, hvis det drejer sig om:

- Vandfugle
- Rovfugle
- Kragefugle
- Måger

Husk, at du kan bruge app'en "fugleinfluenzaTip" til at melde fund af døde vilde fugle ind til Fødevarestyrelsen.

Liste over de fuglearter, der har mest interesse for Fødevarestyrelsen kan findes [her](#).

Læs mere om, hvordan du ellers kan indmelde fundene på Fødevarestyrelsens [hjemmeside](#).

Følg med i AI overvågningen i vildfugle i Danmark her: <https://ai.fvst.dk/>

Referencer

ADIS meddelelser fra EU Kommissionen.

Info notes fra EU Kommissionen.

AI Ekspertgruppe møde.

ADIS database.

Fugleinfluenza databasen: [Fugleinfluenza beredskab \(fvst.dk\)](https://fvst.dk)

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/687 af 17. december 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler om forebyggelse og bekæmpelse af visse listeopførte sygdomme (EØS-relevant tekst)

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/688 af 17. december 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår dyresundhedsmæssige krav vedr. flytning inden for Unionen af landdyr og rugeæg.